治療歴・治療ステージチェック表

1 内視鏡、CT画像などからGISTが疑われる

2 良性の可能性など腫瘍の性質を見るため経過観察

増大

3 GISTと診断された

4 術前化学療法（ネオアジュバント）
手術前のイマチニブ服用

注）イマチニブ＝グリベックとお考え下さい

5 手術

10 手術不能

9 残存腫瘍あり
腫瘍破裂
R1 R2 切除

治療目的でイマチニブ服用
（基本的に効果が続く限り服用）

6 残存腫瘍無し　R0 切除
再発リスクが高いため術後
補助療法（アジュバント）

予防目的でイマチニブ服用
（基本的に3年間服用）

初発の治療

0 **再発治療オプション**

ラジオ波
TAE
手術
放射線など

8 **薬物服用後経過観察**

ウ）ある期間の服用を終えて終了
エ）副作用・個人の事情等で終了

7 **手術後経過観察**

ア）残存腫瘍あり
イ）残存腫瘍なし

11 イマチニブ

12 スーテント

13 スチバーガ

14 ジェセリ

転移・増大・再発の治療

15 **標準治療後の治療を模索**

ゲノム診療・治験参加
承認薬再服用

☆ 治療歴順に番号を記入し現在の治療ステージを確認してください。